



CERF – Groupe Mycologie

Compte-rendu

Sortie du 26/10/ 2025



Cette première sortie après l'exposition de la semaine dernière à la Bergerie Nationale s'est déroulée aux environs de Clairefontaine, au Poteau de la Poterie

Notre groupe de 19 participants rassemblant beaucoup de débutants, nous avons consacré du temps pour partager quelques bases avant de nous enfoncer dans la forêt. Notre briefing s'est concentré sur la présentation des quatre grandes familles à partir d'exemplaires cueillis la veille sur un autre site [les nom latins sont précisés ici pour référence]:

- les champignons à pores et tubes, illustrés par quelques bolets (champignons avec pied et chapeau, et à chair tendre) : cèpe de Bordeaux (*Boletus edulis*), bolet à pied rouge à chair bleuissante (*Neoboletus erythropus*), bolets raboteux (avec pied coriace et squameux) dont un bolet orangé des chênes (*Leccinum aurantiacum*), et suilles (bolets visqueux sous les conifères) dont le bolet de bouviers (*Suillus bovinus*) ainsi qu'un bolet bai (*Imleria badia*)
- les champignons à aiguillons, illustrés par un pied de mouton (*Hydnum repandum*) et un hydne roux (*Hydnum rufescens*)
- les champignons à lames, illustrés par des amanites (avec volve à la base du pied et anneau, et parfois des flocons sur le chapeau), des russules (à chair cassante comme de la craie, mais sans lait), des lactaires (à chair cassante également, mais avec du lait à la coupe) dont le lactaire à lait jaunissant (*Lactarius chrysorheus*) dont le lait est initialement blanc, et quelques autres champignons à lames, dont le Paxille enroulé (*Paxillus involutus*) et la fausse girolle (*Hygrophoropsis aurantiaca*)
- enfin, les autres champignons qui ne sont pas dans l'une des catégories précitées, illustrés par des vesses de loup (*Lycoperdon perlatum*, et *Apioperdon pyriforme*) et une ramaire (*Ramaria stricta*), en forme d'arbuste.

Après cette introduction, nous avons commencé la prospection dans les bois sous la direction de Bernard et Nicole. Nous avons pu y croiser beaucoup d'armillaires couleur de miel très mures (*Armillaria mellea*), ainsi que de nombreux Clitocybes nébuleux (*Clitocybe nebularis*), lactaires à lait jaunissant (*Lactarius chrysorheus*) et Russules noircissantes (*Russula nigricans*), bien reconnaissables à leur chapeau brun foncé, et leurs lames cassantes, épaisses et distantes.

Nous avons également croisé différentes espèces, dont des Bulgaries salissantes (*Bulgaria inquinans*) sur un tronc couché, un tricholome blanc à forte odeur aromatique (*Tricholoma album*), des Collybies beurrées (*Rhodocollybia butyracea*), une belle pézize turquoise (*Chlorociboria aeruginascens*) sur bois pourri, quelques amanites citrines (*Amanita citrina*), et des petites psathyrelles à lames brunes et restes pendants de voile sur la marge du chapeau (*Psathyrella candolleana*). En raison de l'avancement réduit, nous n'avons pu prospecter que la zone feuillue du parcours

En ce qui concerne les espèces « comestibles », nous avons ramassés quelques rares exemplaires de Cèpe de Bordeaux (*Boletus edulis*), bien reconnaissable à son chapeau brun et gras au toucher, la chair rose près de la surface du chapeau et le réseau blanc en haut du pied. Nous avons croisé plusieurs bolets dits raboteux (genres *Leccinum* et *Leccinellum*), avec leur pied coriace et squameux, dont des bolets orangés. Nous avons eu aussi pour certains la chance de distinguer et ramasser des Trompettes de la Mort (*Craterellus cornucopioides*), et de beaux exemplaires de Pleurotes en huître (*Pleurotus ostreatus*), assez rares en milieu naturel sur le Massif de Rambouillet.

Maintenant que l'on approche de la fin de saison, avec l'apparition des *Clitocybes* nébuleux, on ne peut que constater la faible quantité de champignons rencontrée cette année par rapport aux années précédentes, vraisemblablement à cause des faibles précipitations cette automne. Malgré tout, il reste suffisamment d'espèces présentes pour attiser notre curiosité mycologique et apprécier les champignons dans toute leur variabilité et variété.



Le *Clitocybe* nébuleux, abondamment vu aujourd'hui



Des Bulgaries salissantes sur bois mort



Les espèces revues lors du debriefing de fin de sortie



Une cueillette intéressante pour les mycophages



Un bel exemplaire de Cèpe de Bordeaux

Liste des espèces notées – Poteau de la Poterie – Clairefontaine

Genre	espèce	Nom vernaculaire / Autres noms	CD_Ref	Rem
Amanita	citrina	Amanite citrine	39 001	
Amanita	citrina v. alba	Amanite citrine v. blanche	39 005	
Amanita	rubescens	Amanite rougissante, Golmotte	39 128	
Boletus	edulis	Cèpe de Bordeaux	29 388	
Bulgaria	inquinans	Bulgarie salissante	45 908	
Chlorociboria	aeruginascens	Pézize turquoise Chlorosplenium aeruginascens	46 239	
Clitocybe	nebularis	Clitocybe nébuleux Lepista nebularis	32 274	
Collybia	fusipes	Souchette, Collybie à pied en fuseau Gymnopus fusipes, Rhodocollybia fusipes	30 626	
Coprinopsis	picacea	Coprin pie Coprinus picaceus	510 325	
Craterellus	cornucopioides	Trompette des morts	29 937	
Fomitopsis	betulina	Polypore du bouleau Piptoporus betulinus	44 020	
Galerina	marginata	Galère marginée Pholiota marginata	36 003	sur bois enfoui
Hydnum	repandum	Pied de mouton	42 792	
Laccaria	amethystina	Laccaire améthyste Laccaria amethystea	32 178	
Lactarius	chrysorrheus	Lactaire à lait jaunissant, Lactaire à lait doré	39 264	
Lactarius	torminosus	Lactaire à toison, Lactaire à coliques	39 489	
Laetiporus	sulphureus	Polypore souffré, Poulet des bois	43 216	
Leccinum	aurantiacum	Bolet orangé Leccinum quercinum, Leccinum albobstipitatum, Leccinum rufum	29 545	sous chênes
Leccinum	scabrum	Bolet rude	29 628	
Macrolepiota	mastoidea	Lépiote mamelonnée Lepiota mastoidea, Lepiota excoriata v. mastoidea	38 670	
Marasmiellus	perforans	Marasme perforant Mycromphale perforans, Paragymnopus perforans	994 103	
Marasmius	rotula	Marasme petite-roue	31 052	
Mycena	inclinata	Mycène inclinée	30 788	
Neoboletus	erythropus	Bolet à pied rouge Boletus erythropus, Boletus luridiformis	967 890	
Parasola	lactea	Coprin glabre Coprinus leiocephalus, Parasola leiocephala	0	
Phlebia	tremellosa	Mérule tremblante Merulius tremellosus	43 419	
Pleurotus	ostreatus	Pleurote en forme d'huître	34 488	sur tronc couché de feuillu
Pluteus	cervinus	Plutée couleur de cerf (Un) Pluteus atricapillus	38 811	
Psathyrella	candolleana	Psathyrelle de De Candolle, Hypholome de De Candolle Hypholoma candolleianum	37 440	
Rhodocollybia	butyracea	Collybie beurrée Collybia butyracea	509 948	
Russula	betularum	Russule émétique des bouleaux Russula emetica v. betularum	39 710	
Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière	39 680	
Russula	nigricans	Russule noircissante	39 925	
Russula	ochroleuca	Russule ocre et blanche	39 939	
Russula	silvestris	Russule émétique des chênes Russula emetica v. silvestris	39 720	
Russula	vesca	Russule vieux rose, Russule comestible Russula heterophylla v. vesca	40 110	
Tricholoma	album	Tricholome blanc	33 164	
Xerocomellus	chrysenteron	Bolet à chair jaune Xerocomus chrysenteron	520 743	